Identifikace NU DIETA/VÝŽIVA

Jsou realizována preventivní opatření?

NE

Záměna pacienta, diety, množství, konzistence, frekvence:
– zajistit zbytky stravy;
– informovat ošetřujícího lékaře;
– kontrolovat a zaznamenávat aktuální zdravotní stav pacienta dle potřeby a SOP daného ZZ.

Chybné skladování stravy, expirovaná strava:
– zajistit obalový materiál;
– informovat ošetřujícího lékaře;
– zkontrolovat a zaznamenat zdravotní stav pacienta dle potřeby a SOP daného ZZ.

Vznik aspirace:
– zajistit terapii aspirace dle stavu pacienta a ordinace lékaře (SOP daného ZZ);
– zajistit další screening poruch polykání (GUSS).

ANO

Jsou zajištěna další preventivní opatření?

NE

Záměna pacienta, diety, nepodaná dieta:
– před podáním stravy u lůžka zkontrolovat jméno pacienta a dle dekurzu rozpis diety na daný den;
– zvýšené opatrnosti dbát u pacientů trpících onemocněním souvisejícím přímo se stravou (např. celiakie) a pacientům s poruchou kognice;
– minimalizovat případy nepodané diety z důvodu odmítnutí pacientem – zjistit důvody pro odmítání;
– v případě vyšetření pacienta v době podávání stravy zajistit její uschování a dle možností pozdější podání.

Chybné množství, konzistence, frekvence:
– podávat správné množství nejen stravy celkově, ale také správný poměr živin;
– zvýšenou pozornost věnovat množství podávaných tekutin např. dialyzovaným pacientům, seniorům;
– podávat stravu ve správný čas (např. u diabetiků v návaznosti na podaný inzulín, nikoliv naopak);
– zajistit, aby nedošlo k záměně kašovité či tekuté stravy za tuhou apod.

Chybné skladování, prošlá expirace, cizí předmět:
– neskladovat stravu na místech, které k tomu nejsou určené nebo za nevhodných podmínek;
– neskladovat stravu, která má porušený obal, a ne déle než na daný expedovaný den;
– dodržovat oddělené prostory pro skladování stravy;
– před podáním stravy v originálním obalu vždy zkontrolovat datum trvanlivosti výrobku, zejména u potravin snadno podléhajících zkáze;
– zabránit výskytu cizích předmětů ve stravě, zejména vlasů, obalových materiálů apod. – používat ochranné pomůcky, vizuálně kontrolovat stravu před podáním i v průběhu podávání.

ANO

✓ **U hospitalizovaných pacientů přehodnotit riziko vzniku malnutrice min. 1/týdně, při změně stavu okamžitě.**
Pozn.: Lékař informuje pacienta a rodinu o příčinách vzniku, možném průběhu léčby a dalších preventivních opatření.

Vše zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta a do formuláře „Hlášení nežádoucí události“ dle směrnice PZS, v platném znění.